


COVID-19 y embarazo en Tennessee



Entre todos los bebés nacidos de residentes de Tennessee del 1 de marzo de 2020 al 31 de enero, 2023, **18 355 (8%)** tuvo COVID-19 materno confirmado por pruebas PCR en el embarazo



Los ingresos en la UCI al momento del parto fueron **4 veces** más frecuentes entre las mujeres con COVID-19 en el embarazo que entre aquellas sin COVID-19 (**0,4%** frente a **0,1%**)



Ha habido **16 muertes maternas confirmadas** debido a la COVID-19 en el embarazo hasta el 31 de enero de 2023



Entre las muertes maternas confirmadas, ninguna tenía documentación de estar al día en sus vacunas contra la COVID-19

Los CDC recomiendan la vacunación contra la COVID-19 para todas las personas de 6 meses en adelante, incluidas las que estén embarazadas, amamantando, tratando de quedar embarazadas ahora o que podrían quedar embarazadas en el futuro



La vacuna contra la COVID-19 es segura y eficaz en el embarazo



La vacuna contra el COVID-19 **NO** está asociada con disminución de la fertilidad



La vacuna contra el COVID-19 **NO** está asociada con tasas más altas de abortos espontáneos



La vacuna contra el COVID-19 **NO** puede darle la COVID-19 o alterar su ADN